


2024-2025절기 임신부 인플루엔자 예방접종 지원사업

인플루엔자 **예방접종**하고
질병을 이길 병으로!



인플루엔자 예방접종, 임신부에게는 더욱 중요합니다



임신부는 인플루엔자에 감염되면 폐렴 등 합병증
발생 위험이 일반인보다 높아 예방이 꼭 필요하며,
임신부가 인플루엔자에 감염되었을 경우
사산·조산이나 저체중아 출산 등의 위험도 높아집니다

임신 중 인플루엔자 예방접종 ▶ **안심**하고 **접종**하세요!

그동안 전 세계적으로
임신부에게 인플루엔자 백신을 권고하고,
**국제적으로 안정성과 효과성이
인정된 백신입니다**

세계보건기구(WHO), 미국, 호주,
영국, 뉴질랜드 등에서도
임신부에게 인플루엔자 예방접종을
권고하고 있습니다



의료기관 방문 시 꼭 지켜주세요!



건강 상태가 좋은 날
예방접종 받기



접종 대상자, 보호자
모두 **마스크 착용**



손소독 등
개인위생 수칙 준수



접종 후 **20~30분간** 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

예방접종 후 주의 해주세요



- 접종 당일 몸에 무리가 가지 않도록 쉬고,
접종 후 2~3일간 몸 상태를 주의 깊게 살피기

예방접종 후 발생 가능한 이상반응



부어오름, 통증



발열



무력감



근육통



두통

예방접종 후 접종 부위의 빨갛게 부어오름 및 통증, 발열, 무력감, 근육통, 두통 등 경미한 이상반응은 접종 후에 일시적으로 나타날 수 있으며, 대부분 1~2일 이내 호전됩니다

- 접종 후 **고열이나 호흡곤란, 두드러기, 심한 현기증**이 나타날 경우 반드시 의사의 진료를 받으시기 바랍니다

인플루엔자 예방접종으로

임신부와 아기를 모두 지키고
건강하게 보호해주세요!

