


# 4회 접종으로 변경되었습니다!

## 신증후군출혈열 예방접종



질병관리청은 예방접종전문위원회 심의(2026. 6. 17.)를 통해 4회 접종의 장기면역원성 연구결과와 식품의약품안전처 허가사항 등을 종합 검토하여, **신증후군출혈열 예방접종 횟수를 기존 3회에서 4회로 변경하였습니다**

### 대상 감염 위험이 높은 고위험군 (19세 이상 성인)

- 농부 및 군인 등 신증후군출혈열 바이러스에 노출될 위험이 높은 자  
※ 군인 및 군부대 종사자는 국방부 정책에 따라 자체 접종을 실시
- 야외활동이 빈번하여 개별적 노출 위험이 크다고 판단되는 자
- 신증후군출혈열 바이러스를 다루거나 쥐 실험을 하는 실험실 요원

### 백신 한타박스 (사백신)

### 일정 기초 접종 3회, 추가 접종 1회



※ 접종 간격이 권장 일정보다 늦어졌더라도 처음부터 다시 맞지 말고, 남은 횟수만 접종하면 됩니다

## ! 예방접종 전·후 주의사항

### 예방접종 전 주의사항

- + 건강상태가 좋은 날, 예방접종이 가능한지 접종 기관에 사전 확인 후 방문합니다.
- + 접종 기관 방문 시 마스크 착용 등 개인방역 수칙을 준수합니다.
- + 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받습니다.
- + 예방접종 전 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사에게 상담 받아야 합니다.

### 예방접종 후 주의사항

- + 접종 후 20~30분 동안 접종 기관에 머물러, 이상반응 발생 여부를 관찰한 후 귀가합니다.
- + 접종 부위는 청결하게 유지해야 합니다.
- + 접종 당일 반나절 이상 충분히 쉬고, 음주나 지나친 운동은 피합니다.
- + 예방접종 후 2~3일간은 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사에게 진료를 받습니다.

- 예방접종 대상 감염병 정보, 백신 종류, 이상반응 등 접종 관련 세부 정보는 '예방접종도우미 누리집'에서 확인 가능
- 예방접종 시행 여부는 개인의 건강상태 등을 고려하여, 의료인과의 상담을 거쳐 자율적 의사에 따라 결정 가능

## X 이런 분들은 예방접종을 받으면 안됩니다

- + 이전 접종 후 심한 알레르기 반응(아나필락시스 등)이 있었던 경우
- + 백신 성분에 심한 알레르기 반응을 보이는 분
- + 접종 전 1년 이내에 경련 증상이 있었던 분
- + 임신 중이거나 임신 가능성이 있는 경우

## ? 발생 가능한 이상반응

### 예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- + 국소 반응: 접종부위의 통증, 발적, 발진, 종창, 가려움증 등  
※ 접종부위 통증은 비교적 흔하게 보고되며, 대부분 수일 내에 특별한 치료 없이 회복됨
- + 전신 반응: 발열, 권태감, 근육통, 메스꺼움, 매우 드물게 아나필락시스 등

### 예방접종 후 이상반응이 생기면

- + 예방접종 후 생기는 대부분의 이상반응은 가볍고 수일 내에 회복됩니다.
- + 증상이 심해지거나 장기간 지속되는 경우 또는 다른 전신 이상반응이 생기는 경우, 의사의 진료를 받아야 합니다.



### 예방접종후 이상반응 신고 및 피해보상 신청방법 안내

- 예방접종 후 이상반응 발생 시, 의료기관을 방문하여 진료를 받은 뒤 관할 보건소 또는 온라인을 통해 신고
- 예방접종으로 인한 이상반응으로 피해가 발생한 경우 국가보상을 실시

#### 온라인 신고방법

예방접종도우미 누리집 접속 ▶ 안전한 예방접종 ▶ 이상반응 신고제도 안내 ▶ 예방접종 신고하기

#### 피해보상 신청방법

보건소 방문 ▶ 보상 심의 신청